

Atención



UFI: RCWO-60J1-Q00A-4JCP

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Se sospecha que daña al feto. Puede provocar daños en los órganos (ojos, riñón, hígado) tras exposiciones prolongadas o repetidas. Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. Elimínese el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:

- Retírese a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada.
- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, enjuáguese la boca, no provocar el vómito y no administrar nada por vía oral.
- Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

- Irritación de ojos y piel.
- Dermalitis de contacto y sensibilización.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- Tratamiento sintomático.

Mitigación de riesgos en la manipulación

Pulverización mecánica cultivos bajos.

El operador utilizará cuantos de protección química y ropa de protección tipo 6 (contra salpicaduras de productos líquidos) durante la mezcla/carga y aplicación.
Ropa de trabajo adecuada (Ropa de trabajo adecuada: Mono o chaqueta de manga larga y pantalón largo hechos de algodón (>300 g/m²) o de algodón y poliéster (>200 g/m²) y calzado resistente) para la reentrada.

NOTA: Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección química únicamente para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.

Medidas adicionales de mitigación para el operario:

- En la limpieza y mantenimiento del equipo se aplicarán las mismas medidas de protección que en aplicación.

Medidas adicionales de mitigación para el trabajador:

- No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la pulverización.

Medidas adicionales de mitigación para los residentes:

- Los tractores irán equipados con boquillas de baja deriva y además se deberá establecer una banda de seguridad de, al menos 10 metros.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

Mitigación de riesgos ambientales

Para proteger los organismos acuáticos, no aplicar el producto en áreas susceptibles de escorrentía.

Para proteger los organismos acuáticos, respátese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evite la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de envases

Enjuague energicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (SIGFITO).



Capreno SC

COMPOSICIÓN:

tembotriona 34,5% p/v (345 g/L) + tienarcabazona-metil 6,8% p/v (68 g/L)

+ isoxadifen-etil 13,4% p/v (134 g/L).

Contiene: 2-metil-3(2H)-isotiazolona (CAS 2682-20-4)

y 1,2-bencisotiazol-2(2H)-ona

(CAS 2634-33-6)

1L

Contenido neto

Herbicida de postemergencia en maíz contra malas hierbas monocotiledóneas y dicotiledóneas anuales

Suspensión concentrada (SC)

GRUPO 27 | 2 HERBICIDAS

Antes de utilizar el producto,
léase detenidamente la etiqueta.
Uso reservado a agricultores
y aplicadores profesionales.



Fabricado por:
Bayer S.A.S.
74 rue Gorge de Loup
69009 Lyon
Francia

Inscrito en el Registro Oficial de Productos
y Material Fitosanitario con el número: ES-00403

Inscrito y
distribuido por:
Bayer CropScience, S.L.
Av. Baix Llobregat, 3 - 5
08970 Sant Joan Despí
Barcelona
Tel. 93 228 40 00

www.cropsscience.bayer.es

Capreno SC® es un nuevo herbicida sistémico de postemergencia para el control de malas hierbas monocotiledóneas y dicotiledóneas anuales en maíz. Contiene dos sustancias activas con distinto mecanismo de acción; tembotriona del grupo químico de las triketonas (**Grupo HRAC 27**) y tienarcabazona-metil del grupo químico de las sulfonil-amino-carbonil-triazolinonas (**Grupo HRAC 2**). Incluye además en su composición el antidoto isoxadifen-etil, que asegura la selectividad del producto para el cultivo. La persistencia de su acción es suficiente para garantizar la protección del cultivo durante todo el periodo de sensibilidad a la competencia de la flora infestante.

Aplicaciones autorizadas: Maíz grano y ensilaje en post emergencia.

Monocotiledóneas anuales sensibles

Digitaria sanguinalis, *Echinochloa crus-galli*, *Lolium* sp, *Panicum* sp, *Poa annua*, *Setaria* sp y *Sorghum halepense*®

® (de semilla, también de rizoma en estadios muy precoces y dosis alta).

Dicotiledóneas anuales sensibles

Abutilon theophrasti, *Ambrosia artemisiifolia*, *Amaranthus* sp, *Anagallis arvensis*, *Antemis arvensis*, *Brassica napus*, *Capsella bursa-pastoris*, *Centaurea cyanus*, *Chenopodium* sp, *Datura stramonium*, *Galinisoga* sp, *Galium aparine*, *Helianthus annuus*, *Lamium* sp, *Matricaria chamomilla*, *Mercurialis annua*, *Papaver rhoeas*, *Polygonum* sp, *Portulaca oleracea*, *Rumex obtusifolius*, *Senecio vulgaris*, *Sinapis arvensis*, *Solanum nigrum*, *Sonchus arvensis*, *Stellaria media*, *Taraxacum officinale*, *Viola arvensis* y *Xanthium* sp.

Tiene efecto limitativo de *Cyperus* spp.

Dosis y modo de empleo: 0,22-0,29 L/ha de producto en 200-400 L/ha de agua. Aplicar en pulverización entre los BBCH 12-16 (desde el desarrollo de la 2ª hoja hasta el desarrollo de la 6ª hoja del cultivo).

Observaciones: Tratar solamente con el cultivo en buen estado fisiológico y en crecimiento activo. Algunas condiciones agroclimáticas desfavorables, antes o después de la aplicación con Capreno SC®, pueden estresar el cultivo y producir reacciones indeseadas tal como clorosis o retraso en el desarrollo, que desaparecen rápidamente y no influyen en el rendimiento del cultivo. Pueden ser condiciones desfavorables, la humedad excesiva y/o bajas temperaturas, grandes variaciones térmicas entre la noche y el día, sequía, altas temperaturas, escasez de nutrientes y otras. No aplicar ningún insecticida organofosforado por vía foliar 7 días antes o después del tratamiento. En caso de realizarse una aplicación de insecticida organofosforado en granúlos en la siembra del maíz, se recomienda respetar un plazo de al menos 20 días entre la aplicación de éste y Capreno SC®. La aplicación repetida de Capreno SC® u otros herbicidas con el mismo modo de acción en el mismo campo, puede potenciar el desarrollo de biotipos de hierbas resistentes, por lo que se debe alternar con otros herbicidas de diferente modo de acción en los cultivos sucesivos.

Cultivos de reemplazo: Si por causa de un accidente hubiera que levantar el cultivo, podrá resembrarse maíz un mes después de la aplicación tras una labor.

Rotación de cultivos: Después de un maíz tratado con Capreno SC®, en el curso de una rotación habitual, siguiendo las buenas prácticas agrícolas y en condiciones climatológicas normales, se pueden implantar los siguientes cultivos de rotación: trigo y cebada de invierno o primavera, triticale, maíz, sorgo, girasol, soja, maíbo, guisante de primavera, remolacha azucarera tolerante a inhibidores de ALS y judía verde, en caso de patata respetar 12 meses de intervalo mínimo entre aplicación y siembra. Siempre es conveniente realizar una labor profunda previa, especialmente en años con pluviometrías inferiores a la media de la zona. La velocidad de degradación de Capreno SC® en suelo está condicionada por varios factores, como la humedad y el pH entre otros; por lo que los intervalos entre aplicación y siembra pueden variar en función de éstos así como en la sensibilidad de los cultivos en rotación. Se recomienda siempre revisar antes de la siembra del cultivo siguiente si la pluviometría ha sido más baja de lo habitual. La plantación de cualquier otro cultivo no mencionado será responsabilidad exclusiva del usuario.

Plazo de seguridad: No procede.

Advertencia: Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.



ES85803239E

Loty y fecha de fabricación:
Ver marcado interno.

Bayer

