Bayer CropScience, S.L.
www.cropscience.bayer.es

decis® trap

# Protección natural contra *Drosophila suzukii*

decis® trap suzukii

**Mosca de alas manchadas**
*Drosophila suzukii*

BIOLOGICALS by Bayer

***El poder de la naturaleza***
*con la potencia de la ciencia.*

*cropscience.bayer.es*

# // FICHA DE IDENTIDAD

**COMPOSICIÓN**

0,015 g deltametrina/trampa, Atrayentes específicos para *Drosophila suzukii*.

**OBJETIVO**

*Drosophila suzukii* en **cerezo, ciruelo, melocotonero, nectarino, albaricoque, frambuesa, mora, arándanos y otros frutos rojos, caqui, higuera, kiwi y viña.**

**FORMULACIÓN**

VP - Producto difusor de vapor.

**MODO DE ACCIÓN**

Captura masiva, atracción durante 100 días, vida útil de 6 meses.

**DOSIS**

100 trampas/ha

# // BENEFICIOS

// *Trampa **lista para colgar***

// ***Reduce** el número de frutos infestados*

// ***Mínima exposición** para operador y transeunte*

// *Incluido en las normas europeas de **producción ecológica***

// *Imprescindible en estrategia de **minimización de residuos***




# // DECIS® TRAP SUZUKII

**Decis® Trap Suzukii** debe utilizarse dentro de un programa de gestión integrada de plagas.

- Las trampas extraídas de su embalaje están listas para su uso, no es necesaria ninguna manipulación ni activación.
- **No abrir las trampas ni los dispensadores de atrayentes.**

**Productos para profesionales: utilice los productos fitosanitarios con precaución. Antes de usar, lea la etiqueta y la información del producto.**

# // EN FRUTALES

**Cereza, albaricoque, melocotón, ciruela**

- Superficie mínima de uso: **0,5 ha.**
- Colgar de una rama o alambre en la parte superior del árbol, dentro de la vegetación, realizando una **distribución uniforme y homogénea** en la plantación.
- Distancia recomendada entre trampas: **10 m**.
- Instalar la trampa **durante el desarrollo del fruto**, justo cuando se inicie el vuelo de adultos y antes de que el fruto sea receptivo al ataque de la plaga (antes del comienzo del cambio de color de la fruta o 50 días antes de la recolección).

## Resumen de ensayos en cerezas

**16 pruebas, de 2017 a 2021**

**Reducción del porcentaje de frutos infestados**




**En promedio, un 42% de reducción en la fruta infestada en comparación con el programa agrícola sin trampas.**

# // EN BAYAS

**Frambuesa, mora, arándanos y otros frutos rojos.**

La puesta se realizará a media altura de las plantas (frambuesa).

- **Tiempo de colocación de trampas:** como medida preventiva para una serie de cosechas e idealmente antes de la formación de los frutos de la primera cosecha.
- La dosis recomendada es de 100 trampas/ha con una **superficie mínima de 1.500 m² para poder beneficiarse del efecto** masa necesario para esta técnica de protección. Respetar los tiempos y dosis de uso.

## Resumen de ensayos en frambuesas

**33 pruebas, de 2016 a 2021**




**Buena eficacia de Decis® Trap Suzukii hasta 100 días de persistencia.**