



# Fandango®

COMPOSICIÓN:  
fluoxastrobin 10% p/v (100 g/L) +  
protioconazol 10% p/v (100 g/L)

5 L

Contenido neto

Fungicida para el control de las principales enfermedades foliares de la cebolla: mildiu, estemfiliosis y roya

Concentrado emulsionable (EC)

**GRUPO 11 | 3 FUNGICIDAS**

Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta.  
Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.

Fabricado por:  
**Bayer S.A.S.**  
16 rue Jean-Marie Leclair  
F-69266 Lyon, (Lyon Cedex 09)  
Francia

Inscrito en el Registro Oficial de Productos  
y Material Fitosanitario con el número: **ES-00115**

Inscrito y  
distribuido por:  
**Bayer CropScience, S.L.**  
Av. Baix Llobregat, 3 - 5  
08970 Sant Joan Despi  
Barcelona  
Tel. 93 228 40 00

[www.cropscience.bayer.es](http://www.cropscience.bayer.es)

ES0909690CB

Peligro



**Fandango®**

Fandango® 5 L

Composición: fluoxastrobin 10% p/v (100 g/L) + protriocanazol 10% p/v (100 g/L).  
Inscrito y distribuido por: Bayer CropScience, S.L. Av. Baix Llobregat, 3 - 5,  
08970 Sant Joan Despí (Barcelona). Tel. 93 228 40 00.

- Provoca lesiones oculares graves.
- Se sospecha que daña al feto.
- Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.
- Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- Evitar respirar la niebla de pulverización.
- Llevar guantes, prendas y gafas de protección.
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Recoger el vertido.

**EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO. LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.**

**A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.**

#### RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

##### Medidas básicas de actuación:

- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, NO provoque el vómito, salvo que así lo indique el Centro de Toxicología o un profesional de la salud.
- Si es necesario traslade al intoxicado a un centro sanitario y lleve la etiqueta o el envase.

**NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**

**Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:**

- Irritación de ojos, piel y mucosas.

**Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:**

- Tratamiento sintomático.

UFI: MEC0-G0JU-C00U-T9JY

**Mitigación de riesgos en la manipulación:** El aplicador deberá utilizar guantes de protección química, ropa de trabajo adecuada y botas de protección durante la mezcla/carga, aplicación y limpieza del equipo. Debido a la clasificación del preparado, se deberá usar protección ocular y/o facial: gafa de protección o pantalla facial según norma UNE-EN166: 2002, durante la mezcla y carga del producto.

No entrar en los cultivos tratados hasta que se haya secado la aplicación.  
Durante la aplicación con tractor se deberán usar los guantes de protección para manipular el equipo de aplicación o superficies contaminadas.  
La recolección se realizará únicamente mediante procedimientos mecánicos.

**Mitigación de riesgos medioambientales:** Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 20 metros hasta las masas de agua superficial. No aplicar en invierno en suelos arenosos, pedregosos o drenados artificialmente.

**NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE** (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales / Evitese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Fandango® es un fungicida que combina fluoxastrobin, nueva sustancia activa perteneciente a la familia química de las estrobilurinas, con protriocanazol, para el control de las principales enfermedades foliares en cebolla: mildiu, estemfiliosis y roya.

#### Aplicaciones autorizadas

- **Cebolla** contra mildiu (*Peronospora destructor*), estemfiliosis (*Pleospora allii*) y roya (*Puccinia allii*).

#### Dosis y modo de empleo

Aplicar en pulverización foliar con tractor con cabina cerrada, exclusivamente en cebolla cosechada mecánicamente, a dosis de 1-1,25 L/ha y con un volumen de caldo de 300-800 L/ha.

Se realizará un máximo de 2 aplicaciones por campaña, separadas al menos 10 días, a partir de las 5 hojas verdaderas (BBCH 15: 5ª hoja (>3 cm) visible) y hasta el inicio de la inclinación del follaje (10% de las hojas inclinadas, BBCH 47).

**Plazo de seguridad:** 21 días entre el último tratamiento y la recolección.

#### Observaciones

Para evitar la aparición de resistencias, respetar estrictamente las limitaciones de esta etiqueta en el número de aplicaciones por campaña. Es aconsejable que las aplicaciones de Fandango® se alternen con fungicidas pertenecientes a diferentes familias químicas.

**GESTIÓN DE ENVASES:** Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por el Sistema Integrado de Gestión SIGFITO.



**Nota:** Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta, son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.



8 422686 658993

ESS00684201B



Lote y fecha de fabricación:  
Ver marcado impreso

**Bayer**