

Ambition® AKTIVATOR

Nawóz organiczny

Kraj pierwszego wprowadzenia do obrotu: Włochy. Kategoria: Płynne organiczne nawozy azotowe
All. 13 IT All. 1.5.1.1.6 zgodnie z Dekretem Ustawodawczym nr 75 z dnia 29/04/2010, numer
rejestracji 0044783/25

Produkt wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na mocy Art. 5 Ustawy
o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r (Dz.U. 2007 nr.147 poz.1033 z późn.zm.)

Numer świadectwa kwalifikacji
produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym nadany
przez IUNG-PIB w Puławach NE/919/2025.

Skład %:

Azot całkowity (N) 8,3%
Azot organiczny (N_{org}) 7,5%
Bor (B) rozpuszczalny w wodzie 0,04%
Mangan (Mn) rozpuszczalny w wodzie 0,4%
Cynk (Zn) rozpuszczalny w wodzie 1,2%
Węgiel organiczny (C_{org}) 23%
pH 5,0-6,0

SKŁADNIKI:

hydrolizowane białka, boran sodu, sól sodowa, mangan, sól cynku.

Producent:

SICIT GROUP SPA
Via Arzignano 80
36072 Chiampo Włochy
Tel. 0444 450946
Email: info@sicitgroup.com
www.sicitgroup.com

Podmiot wprowadzający nawóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
tel.: 22 572 35 00
www.agro.bayer.com.pl

Ambition® AKTIVATOR to nawóz organiczny zawierający wysokiej jakości hydrolizowane białka pochodzenia naturalnego, kwasy fulwowe oraz niezbędne mikroelementy (cynk, bor i mangan).

Ambition® AKTIVATOR:

- wspomaga rozwój roślin,
- poprawia wigor wegetatywny i generatywny roślin,
- poprawia kwitnienie i wspomaga wzrost owoców.

Instrukcja stosowania:

Ambition® AKTIVATOR jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie.

W przypadku niskiej temperatury lepkość produktu wzrasta, a płynność może się zmniejszyć, jednak bez uszczerbku dla jakości produktu.

Można stosować samodzielnie lub w mieszaninie z większością środków ochrony roślin stosowanych w rolnictwie.

Przed zastosowaniem w mieszaninie z innymi produktami zaleca się przeprowadzić próbę mieszalności.

Produktu nie należy stosować w mieszaninie z olejami mineralnymi oraz produktami miedziowymi.

Dawkowanie i sposób użycia:

Ambition® AKTIVATOR przeznaczony jest do stosowania w rolnictwie, ogrodnictwie i ogrodnictwie amatorskim. Produkt najlepiej stosować w formie zabiegu nalistnego. Można go także stosować do podlewania roślin (fertygacji), w dawkach i terminach określonych w tabeli poniżej.

Przed użyciem wstrząsnąć opakowaniem. Napętnić zbiornik opryskiwacza przynajmniej do połowy wymaganej ilości wody. Przy włączonym mieszadło dodać odmierzoną ilość produktu (w przypadku braku mieszadła intensywnie mieszać), a następnie uzupełnić brakującą ilość wody.

Uprawa	Dawka produktu (L/ha)		Liczba zabiegów		Odstęp między zabiegami	Zalecana ilość wody (L/ha)		Faza wzrostu rośliny uprawnej w czasie zabiegu	Rodzaj aplikacji	Zastosowanie polowe (P) lub pod osłonami (O)
	Min	Max	Min	Max		Min	Max			
Zboża	1	2	1	4	14 dni	100	400	BBCH11–BBCH 69 (wzrost, wschody, kłoszenie)	Zabieg nalistny	P
Rzepak Słonecznik	1	2	1	3	14 dni	200	400	BBCH11–BBCH 69 (od wczesnych faz wzrostu do końca kwitnienia)	Zabieg nalistny	P
Burak cukrowy	1	2	1	3	14 dni	200	400	BBCH15–BBCH 49 (od wczesnych faz wzrostu do wzrostu korzenia)	Zabieg nalistny	P

Soja	1	2	1	3	14 dni	100	300	BBCH11–BBCH 69 (od wczesnych faz wzrostu do końca kwitnienia)	Zabieg nalistny	P
Tytoń	1	2	1	3	7-10 dni	200	1000	BBCH15–BBCH 69 (od wczesnych faz wzrostu do końca kwitnienia)	Zabieg nalistny	P
Kukurydza Sorgo	1	3	1	3	14 dni	100	300	BBCH11–BBCH 69 (od rozwoju pierwszego liścia do końca kwitnienia)	Zabieg nalistny	P
Ziemniak	1	3	1	4	14 dni	200	1000	BBCH 15 – BBCH 79 (okres wschodów, kwitnienie, rozwój owoców)	Zabieg nalistny Podlewanie / nawadnianie kropelkowe	P
Len	1	3	1	3	14 dni	100	300	BBCH15 – BBCH 69 (od wczesnych faz wzrostu do końca kwitnienia)	Zabieg nalistny	P
Warzywa dyniowate, psiankowate i strączkowe	1	3	2	6	7-14 dni	200	1500	Od siewu / sadzenia do rozwoju owoców	Zabieg nalistny Podlewanie / nawadnianie kropelkowe	P, O
Warzywa liściaste, kapustne, korzeniowe, cebulowe i łodygowe	1	3	2	6	7-14 dni	100	1000	od siewu / sadzenia do rozwoju owoców	Zabieg nalistny Podlewanie / nawadnianie kropelkowe	P, O
Drzewa ziarnkowe i pestkowe	1	3	1	6	14 dni	500	1500	BBCH 00 – BBCH 87 (okres spoczynku, kwitnienie, zawijanie i rozwój owoców) do fazy dojrzałości owoców do zbioru	Zabieg nalistny	P
	2	6							Podlewanie / nawadnianie kropelkowe	
Rośliny jagodowe (truskawka, borówka, malina i inne)	1	3	1	6	14 dni	200	1000	BBCH 15 – BBCH 89-od fazy rozwoju 5. liścia do końca fazy dojrzwania owoców, (faza pkania paków, kwitnienie, rozwój owoców)	Zabieg nalistny	P, O
Winorośl	1	3	1	6	7-10 dni	100	1500	BBCH 00 – BBCH 89 (od początku wegetacji do końca fazy dojrzwania owoców)	Zabieg nalistny	P
	1	6							Podlewanie / nawadnianie kropelkowe	
Leszczyna, orzech włoski	1	3	1	6	7- 14 dni	100	1500	BBCH 15 – BBCH 87 (od fazy pkania paków i rozwoju 5. liścia do fazy dojrzałości owoców)	Zabieg nalistny	P
	2	6	1	6	7- 14 dni	500	1500	BBCH 00 – BBCH 87 (od początku wegetacji do fazy dojrzałości owoców)	Podlewanie / nawadnianie kropelkowe	P
Aktinidia	1	3	1	6	7-10 dni	100	1500	BBCH 15 – BBCH 81 (od fazy pkania paków i rozwoju 5. liścia do początku dojrzwania owoców)	Zabieg nalistny	P
	1	6	1	6	7-10 dni	100	1500	BBCH 00 – BBCH 81 (od okresu spoczynku do początku dojrzwania owoców)	Podlewanie / nawadnianie kropelkowe	P

Zalecenia dotyczące przechowywania:

Przechowywać w oryginalnym i zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ognia.

Przechowywać w temperaturze od 4°C do 30°C, w miejscu dobrze wentylowanym, chronionym przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Specjalna formuła i technologia produkcji Ambition® AKTIVATOR zapewnia trwałość produktu przez co najmniej 5 lat od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

Środki ostrożności:

Przy sporządzaniu cieczy roboczej stosować środki ochrony osobistej (rękawice, kombinezon, ochronę oczu i twarzy).

Unikać kontaktu z rozlanym produktem lub skażoną (zanieczyszczoną) powierzchnią.

W przypadku wycieku zebrać przy użyciu trocin i/lub piasku.

Nie dopuścić do przedostania się produktu do wód powierzchniowych, gruntowych i wód opadowych.

Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących ponownego wejścia ludzi i zwierząt na obszar poddany zabiegowi.

Nie należy wypasać zwierząt gospodarskich ani używać zbiorów jako roślin na paszę przez co najmniej 21 dni po zastosowaniu.

Nie stwierdzono fitotoksyczności produktu w stosunku do upraw podlegających zabiegowi.

Okres przydatności:

5 lat od daty produkcji

Objętość netto: L

Masa netto:..... kg

Uwaga:

Skład, recepturę i zawartość składników odżywczych są gwarantowane przez SICIT GROUP SPA. Podane zalecenia i informacje są wynikiem rygorystycznych testów i badań. Jednak podczas stosowania mogą wystąpić liczne czynniki, na które Bayer Sp. z o.o. nie ma wpływu (przygotowanie mieszanin, zastosowana technika stosowania, warunki pogodowe itp.).

Bayer Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody (brak skuteczności, ogólna toksyczność, pozostałości itp.) w przypadku nieprzestrzegania instrukcji podanych w etykiecie.



H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.

P391 Zebrać wyciek