¿Cómo funciona FLiPPER® y cómo sacarle el máximo provecho?

FLiPPER® actúa como un producto de contacto.
Ataca rápidamente las capas externas de las plagas y bloquea funciones celulares esenciales. Aplicado directamente sobre las plagas, ofrece **máxima eficacia y control de amplio espectro**.
Para aprovecharlo al máximo, **sigue cuidadosamente las instrucciones de uso**.

FLiPPER® 1% – eficacia sobre diferentes objetivos y etapas durante el cultivo en interior.
La aplicación en la primera fase del desarrollo poblacional es clave; su efectividad se ve influenciada por la calidad de la pulverización y la accesibilidad al objetivo.

	Huevos	Ninfa/Larva				Pupa	Adulto
TUTA ABSOLUTA							
PULGONES							
MOSCA BLANCA							
TRIPS							
ARAÑA ROJA							
VASATES							
EMPOASCA							
PSILA DEL PERAL							

Nivel de control: ● bueno ● medio ● bajo

¿Y en caso de aguas duras?

Recuerda mezclar con Aquasoft en caso de aguas de dureza >500 ppm a la dosis de 0,1% (1 L por cada 1.000 L de agua):

Aquasoft

// **Acondicionador de aguas diseñado por Bayer** para **garantizar la máxima eficacia** y el **correcto manejo en situaciones difíciles**.
// Ideal para combinar con productos a base de **sales alcalinas de ácidos grasos**.
// Actúa incluso en aguas **extraordinariamente duras**.

Para más información
visite nuestra web
www.cropscience.bayer.es

Preguntas frecuentes

FLiPPER®
tu respuesta inteligente

BIOLOGICALS by Bayer

FLiPPER®

BAYER

¿Por qué usar FLiPPER®?

FLiPPER® es una excelente incorporación a tus prácticas actuales, ya que es eficaz contra una amplia gama de plagas. En la siguiente tabla puedes ver específicamente contra cuáles actúa. Pero eso no es todo: su modo de acción único no solo mejora el control de plagas, sino que también reduce los problemas de resistencia. Es decir, es una solución confiable y única para múltiples desafíos.

Como su ingrediente activo se extrae durante el proceso de elaboración del aceite de oliva, **usar FLiPPER® no genera problemas de residuos**, sin importar cuándo se aplique. **Se adapta perfectamente a las prácticas agrícolas sostenibles** y contribuye a responder a la creciente demanda de productos sostenibles.

Puedes **integrarlo perfectamente en todos los programas de pulverización** y obtener los mismos beneficios: **flexibilidad en el momento de la cosecha** y en la planificación logística, ya que tiene intervalos de reentrada o pre-cosecha muy cortos o inexistentes, lo que **mantiene tu producción lista para el mercado**.

FLiPPER® 1% – selectividad sobre diferentes organismos beneficiosos

Tipo de organismo beneficioso	Especies de organismos beneficiosos	Objetivo de las especies beneficiosas	Resultados del Test FLiPPER® 1% v/v
PARASITOIDE	*Anagyrus pseudococci*	Cochinillas	IOBC 1 (1)
	Aphidius colemani	Pulgones	IOBC 1 (1)
	Diglyphus isaea	Minador	IOBC 1 (1)
	Encarsia formosa	Mosca blanca	IOBC 1-2 (1)
	Lysiphlebus spp.	Pulgones	IOBC 1 (1)
	Trichogramma sp.	Lepidoptera	IOBC 1 (1)
INSECTOS DEPREDADORES	*Anthocoris nemoralis*	Psila	IOBC 1-2 (1)
	Aphidoletes aphidimyza	Pulgones	IOBC 1 (1)
	Chrisopids (Chrysoperla)	Depredador polífago	IOBC 1 (1)
	Cocinnela spp.	Pulgones	IOBC 2 (1)
	Cryptolaemus montrouzieri	Cochinillas	IOBC 2 (1)
	Delphastus catalinae	Mosca blanca	IOBC 2 (1)
	Feltiella acarisuga	Ácaros tetraniquidos	IOBC 1 (1)
	Macrolophus caliginosus (Mirid)	Depredador polífago	IOBC 1-2 (1)
	Nesidiocoris tenius (Mirid)	Depredador polífago	IOBC 1-2 (1)
	Orius laevigatus	Thrips	IOBC 1-2 (1)
	Sirphids (Sphaerophoria rueppellii)	Pulgones	IOBC 1 (1)
ÁCARO DEPREDADOR	*Amblyseius swirskii*	Thrips, Mosca blanca	IOBC 1 (1)
	Kampimodromus aberrans	Araña roja	IOBC 2 (1)
	Neoseiulus (Ambliseius) cucumeris	Thrips	IOBC 1 (1)
	Neoseiulus (Ambliseius) californicus	Araña roja	IOBC 1 (1)
	Phytoseilus persimilis	Ácaros tetraniquidos	IOBC 1-2 (1)
	Typhlodromus pyri	Araña roja	IOBC 1-2 (1)

Clasificación IOBC: 1 = inofensivo, 2 = ligeramente dañino, 3 = moderadamente dañino, 4 = dañino

¿Cómo se integra FLiPPER® en mis prácticas actuales?

FLiPPER® puede integrarse fácilmente en diversas estrategias de Manejo Integrado de Plagas (MIP), con una buena capacidad de mezcla en tanque con otros fungicidas e insecticidas

Puedes aplicarlo en diferentes etapas de crecimiento y bajo diversas condiciones climáticas a lo largo del ciclo de cultivo.
Pero aunque sea compatible con muchas mezclas en tanque, ten cuidado con ciertos productos: evita mezclarlo con fosetil-aluminio, miclobutanil, cipermetrina o iones metálicos distintos del cobre.
En caso de duda, consulta con tu experto de Bayer para asegurar resultados óptimos.

¡Descubre cómo combinar FLiPPER® con otros productos en distintos cultivos!

PROGRAMA EN TOMATE

FLiPPER® puede ayudar en el manejo de Vasates, Tuta y mosca blanca.
La estrategia de aplicación debe ajustarse al ciclo del cultivo, la presión de plagas, el uso de organismos beneficiosos y expectativas como la ausencia de residuos.
Para obtener los mejores resultados, aplica FLiPPER® en un bloque de dos aplicaciones con un intervalo de siete días. Frente a Tuta, destaca su eficacia como ovicida. Contra Vasates, recomendamos la mezcla FLiPPER® + Elosal® GD (azufre mojable).
Además, FLiPPER® es un excelente adulticida de moscas blancas.

TUTA ABSOLUTA	VYNYTY®	FLiPPER	FLiPPER			FLiPPER	FLiPPER	VYNYTY®	
VASATES		FLiPPER	Elosal® GD	FLiPPER	Elosal® GD			FLiPPER	Elosal® GD

PROGRAMA EN VIÑA

Combina FLiPPER® con Sivanto® y Decis® Evo para combatir las principales plagas en tu cultivo de viña (***Scaphoideus* y *Empoasca***).

		FLORACIÓN			RACIMO CERNIDO		ENVERO
19		65–69	73	77	79	81–83	85
	FLiPPER		SIVANTO prime		FLiPPER		
				Decis® Evo			

PROGRAMA EN MANZANA

FLiPPER® es el socio ideal para complementar la acción insecticida de Sivanto® frente a pulgones, sin añadir residuos adicionales en la cosecha.

09	10	55	56	57	59	60_65	67_69	72	74	75_79	81_87
			PRE-FLORAL			POST-FLORAL					
	FLiPPER										
	SIVANTO prime										

PROGRAMA EN PERA

FLiPPER® es tu aliado en el control de Psila (*Cacopsylla pyri*) en tu cultivo de pera. La aplicación de FLiPPER® debe realizarse cuando se produzcan las primeras eclosiones de los huevos, en estado de Ninfa (N1). Para mejorar resultados, aplica FLiPPER® en bloques de dos aplicaciones con un intervalo de siete días (máximo 5 aplicaciones).

09	59	60_65	67_69	72	74	75_79	81_87
PRE-FLORAL		POST-FLORAL					
			FLiPPER				

PROGRAMA EN LECHUGA

Por su efecto de contacto y su eficacia con registro al aire libre frente a *Nasonovia ribinisgri*, **FLiPPER® es una excelente herramienta para integrarse en las estrategias de control de pulgón**. Recomendamos aplicaciones a la dosis de 1%, solo o en mezcla con aficidas sistémicos, y antes del cierre de la cabeza de la lechuga para garantizar el contacto con la plaga. Puede aplicarse en intervalos de 7 días.

TRASPLANTE			CRECIMIENTO			COSECHA
	FLiPPER	FLiPPER	FLiPPER	SIVANTO prime		