


Herbicide

INCELO[®]

1,5 kg



UN 3077

NL92160097A

ARTIKELNR.: 92158920

Produktnaam: Incelo

Toelatingsnummer: 16410 N – W0

Werkzame stof: mesosulfuron-methyl, thienencarbazon-methyl

Gehalte: 45 g/kg, 15 g/kg

Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat

Professioneel gebruik

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: -

Gevarenaanduidingen:

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoeien met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor afval. Zie STORL.

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.

Droog, koel en achter slot bewaren.

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

WAARSCHUWING



Lege, schone en droge verpakking kan bij STORL worden ingeleverd.

UFI: CUV0-50DN-V00C-5GV9

Werkingswijze

GROUP

2

HERBICIDE

NL92160089B

UN 3077



IN GEVAL VAN NOOD:

Bij vergiftiging uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners:
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)88 755 8000
In overige gevallen Bayer CropScience
+31 (0)6-553 724 90

® is een geregistreerd handelsmerk van de Bayer Groep

Chargenummer:
zie elders op de verpakking

Bayer CropScience SA-NV
Postbus 88
2130 AB Hoofddorp
Tel. 023-7991095

Bayer



EERSTE HULPMAATREGELEN

Algemeen advies

Buiten de gevaarlijke zone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele zijligging. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen.

Inademing:

De patient in de frisse lucht brengen en in een rustige omgeving houden. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele zijligging. Onmiddellijk een arts waarschuwen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).

Aanraking met de huid:

Met veel water en zeep afwassen, indien voor handen, met veel polyethyleenglykol 400. Vervolgens reinigen met water. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.

Aanraking met de ogen:

Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten. Eventueel aanwezige contactlenzen pas na 5 minuten verwijderen. Daarna de oogspoeling weer voortzetten. Medische hulp inroepen als irritatie optreedt en aanhoudt.

Inslikken:

GEEN braken opwekken. Mond spoelen. Onmiddellijk een arts waarschuwen (die eventueel contact kan opnemen met het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC)).

Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Verschijnselen: Effecten zijn niet bekend en worden ook niet verwacht.

Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Behandeling: Symptomatisch behandelen. Alleen binnen 2 uur na opname van een grote hoeveelheid door de mond een maagspoeling doorvoeren. In alle gevallen is toedienen van actief kool (norit) met natriumsulfaat aanbevolen. Een specifiek tegengif is niet bekend.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een na- opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.2, Ctgb juni 2019) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Wintertarwe	duist ¹ , grote windhalm ² , straatgras ³ , breedbladige onkruiden	0,2 kg/ha ** A	1
	duist ¹ , breedbladige onkruiden	0,33 kg/ha** B	
	duist ¹ , raaigrassen ⁴ , haver ⁵ , ijle dravik ⁶ , breedbladige onkruiden	0,33 kg/ha ** C	
Winterrogge	duist ¹ , grote windhalm ² , straatgras ³ , breedbladige onkruiden	0,2 kg/ha ** A	1

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus
Triticale	duist ¹ , grote windhalm ² , straatgras ³ , breedbladige onkruiden	0,2 kg/ha ** A	1
	duist ¹ raaigrassen ⁴ , haver ⁵ , ijle dravik ⁶ , breedbladige onkruiden	0,33 kg/ha ** C	
Spelt	duist ¹ , grote windhalm ² , straatgras ³ , breedbladige onkruiden	0,2 kg/ha ** A	1
Durum wintertarwe	duist ¹ , grote windhalm ² , straatgras ³ , breedbladige onkruiden	0,2 kg/ha ** A	1
	duist ¹ , raaigrassen ⁴ , haver ⁵ , ijle dravik ⁶ , breedbladige onkruiden	0,33 kg/ha ** C	

* Verlaging van de dosering is toegestaan, hierbij dient rekening gehouden te worden met resistentiemanagement. Van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen;

** In combinatie met 1 L/ha toevoegingsstof (veresterde plantaardige olie of Biopower);

^A vanaf 3^e blad (BBCH 13) tot 1^e knoop stadium (BBCH 31);

^B vanaf 3^e blad (BBCH 13) tot 9 bladeren of meer (BBCH 19);

^C vanaf begin van uitstoeling (BBCH 20) tot 1^e knoop stadium (BBCH 31);

¹ duist (*Alopecurus myosuroides*);

⁴ raaigrassen (*Lolium* spp.);

² grote windhalm (*Apera spica-venti*);

⁵ haver (*Avena* spp.);

³ straatgras (*Poa annua*);

⁶ ijle dravik (*Bromus sterilis*).

Overige toepassingsvoorwaarden

Voorzorgsmaatregelen om schuimvorming tijdens het tankmixen te voorkomen:

1. Vul eerst de tank tot ongeveer 25-50% met water en begin te roeren.

2. Voeg dan al roerend de juiste hoeveelheid Incelo toe.

3. Vul vervolgens de spuittank met water tot 90% onder voortdurend roeren.

4. Voeg vervolgens de toevoegingsstof (Biopower of veresterde plantaardige olie) toe.

5. Vul vervolgens de spuittank met water tot 100% van het spuitvolume onder voortdurend roeren.

Voorkom schuimvorming (voorkom aanzuigen van lucht in de vultrechter en voorkom water toevoegen van bovenaf).

In de teelt van wintergraan het middel in het voorjaar toepassen.

In de teelt van wintertarwe, winterrogge, triticale, spelt en durum wintertarwe het middel toepassen in 100-400 L water/ha.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Let op: Na toepassing van het middel kan gewasschade ontstaan.

Volggewassen

Na de oogst van het behandelde gewas kunnen in een normale vruchtopvolgning witte mosterd, maïs, haver, sojaboon, zonnebloem en uien worden verbouwd mits een licht grondbewerking wordt uitgevoerd en wintergranen mits een kerende grondbewerking wordt uitgevoerd van minimaal 10 cm diep. Na ploegen of roterend spitten (min. 20 cm diep) kunnen ook suikerbiet en koolzaad worden verbouwd.

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen mesosulfuron-methyl en thiencarbazon-methyl. Mesosulfuron-methyl behoort tot de sulfonylureum verbindingen. De Hrac code is 2. Thiencarbazon-methyl behoort tot de sulfonyl-amino-carbonyl-triazolinone groep. De Hrac code is ook 2. In Nederland zijn onkruiden aangetroffen die resistent zijn tegen werkzame stoffen met HRAC code 2. Omdat er binnen deze groep kruisresistentie bestaat, dit middel afwisselen met middelen met een ander werkingsmechanisme. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

AANBEVELINGEN

Algemeen

Incelo is een systemisch werkend herbicide dat voornamelijk door het blad en in geringe mate door de wortels wordt opgenomen.

Kort na toepassing stopt de groei van de onkruiden waarna de werking van Incelo zichtbaar wordt in de vorm van

bladvergeling en uiteindelijke afsterving van blad en scheuten.

Incelo bestrijdt duist, straatgras, raaigrassen, windhalm, dravik, wilde haver (oot) en een groot aantal breedbladige onkruiden. Over het algemeen zijn deze onkruiden in een jong stadium het meest gevoelig. Het beste resultaat wordt verkregen als de onkruiden actief groeien.

Algemeen geldt dat hoe eerder de toepassing plaatsvindt des te beter het eindresultaat is.

Vanwege resistentiemanagement is niet meer dan één toepassing per teeltseizoen mogelijk.

Attentie

De behandeling moet steeds worden uitgevoerd op een gezond gewas, dat niet is verzwakt door ziekten, insecten, gebreksverschijnselen of andere factoren die de normale ontwikkeling van het gewas kunnen verstoren. De werking van Incelo is beperkt afhankelijk van de weersomstandigheden. De opname door de planten is optimaal als ze actief groeien

(temperatuur boven de 5°C) en de luchtvochtigheid hoger is dan 60%. Geen behandeling uitvoeren bij (verwachting van) nachtvorst of zeer hoge temperaturen. Bij voorkeur niet toepassen op een nat gewas.

Bij toepassing op een droog gewas worden de actieve stoffen binnen 4 uur opgenomen door de plant.

Incelo moet gecombineerd worden met 1 l/ha veresterde koolzaadolie zoals Robbester of Actirob B.

Volggewassen

Ongunstige weersomstandigheden, zoals langdurige droogte na toepassing, overvloedige regenval of erosie hebben mogelijk een effect op de snelheid van herbiciden afbraak en daarmee op de hoeveelheid residu in de bodem.

Voor de zaai van kruisbloemige groenbemesters volstaat een oppervlakkige grondbewerking van 10 - 15 cm.

Naast de in het WG aangegeven mogelijke volggewassen kunnen ook cichorei en vlas worden verbouwd als nateelt.

Voorafgaand aan deze teelten en die van alle andere gewassen dient een kerende grondbewerking te worden uitgevoerd. De grondbewerking moet zorgen voor een goede menging van grond van verschillende diepte. Iedere vorm van minimale grondbewerking wordt ontraden.

Vervanggewassen

Als vervanggewas kan naast de in het wettelijk gebruiksvoorschrift genoemde gewassen ook maïs worden geteeld mits voorafgaand aan de herinzaai een kerende grondbewerking wordt uitgevoerd.

Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding

Na een gewasbehandeling uitsluitend herbetreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd. Werkzaamheden kunnen vervolgens worden uitgevoerd zonder gebruik van beschermende maatregelen.

Overige informatie

Reiniging spuitapparatuur

Incelo is een middel uit de groep van de ALS remmers. Daarom is het uiterst belangrijk de tank goed te reinigen (inclusief dop- en pompfilters en leidingen) met bijvoorbeeld Primaclean alvorens een volgende bespuiting uit te voeren in een andere teelt.

Resistentiemanagement herbiciden

Onkruiden kunnen bij herhaaldelijk gebruik resistentie ontwikkelen tegen producten met hetzelfde werkingsmechanisme. Pas daarom geïntegreerde praktijken voor onkruidbeheer toe. Gebruik meerdere herbicide werkingsmechanismen met overlappende onkruidspectra binnen de teelt maar ook in de vruchtwisseling om de werkzaamheid te verhogen op bijzondere onkruidsoorten, die onvoldoende worden bestreden.

Maak landbouwmachines tijdig schoon. Gebruik waar nodig cultuurmaatregelen (ploegen, zaaitijd, enz.) en vruchtwisseling.

Voorkom insleep van buitenaf. Neem voor meer informatie over resistentiemanagement contact op met uw adviseur.

*HRAC – Herbicide Resistance Action Committee

Voorkomen emissie

Raadpleeg de “Toolbox Emissiebeperking” op www.toolboxwater.nl voor meer informatie over alle vormen van emissies naar oppervlaktewater, zoals het voorkomen van afspoeling, het verwerken van restanten en de reiniging van machines.

Deze gebruiksaanwijzing is opgesteld volgens de laatste inzichten. De gegevens over eigenschappen en toepassingen van onze producten beantwoorden aan de - na zorgvuldig onderzoek - opgedane ervaringen.

Veel factoren buiten de invloed van Bayer Crop Science zoals onder meer opslag, vervoer, de wijze van toepassing, de teeltwijze, de dosering etc. kunnen de werking van het product beïnvloeden, zodat Bayer Crop Science in verband hiermee geen enkele aansprakelijkheid kan accepteren.

Overigens zijn onze Algemene Verkoopvoorwaarden van kracht.

ARTIKELNR.: 92158920

Produktnaam: Incelo

Toelatingsnummer: 16410 N – W0

Werkzame stof: mesosulfuron-methyl, thienencarbazon-methyl

Gehalte: 45 g/kg, 15 g/kg

Aard van het preparaat: Water dispergeerbaar granulaat

Professioneel gebruik

De identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de indeling van het mengsel: -

Gevarenaanduidingen:

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorzorgsmaatregelen:

P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming.

P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

P391 Gelekte/gemorste stof opruimen.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel punt voor afval. Zie STORL.

SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Aanvullende etiketelementen:

EUH401 Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Verkoop alleen toegestaan in onze ongeopende verpakking.

Droog, koel en achter slot bewaren.

Verpakking mag niet opnieuw worden gebruikt.

WAARSCHUWING



STORL



Lege, schone en droge verpakking kan bij STORL worden ingeleverd.

UFI: CUV0-50DN-V00C-5GV9

Werkingswijze

GROUP

2

HERBICIDE

NL92160089B

UN 3077



IN GEVAL VAN NOOD:

Bij vergiftiging uitsluitend bestemd voor professionele hulpverleners:
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) +31 (0)88 755 8000
In overige gevallen Bayer CropScience
+31 (0)6-553 724 90

® is een geregistreerd handelsmerk van de Bayer Groep

Chargennummer:
zie elders op de verpakking

Bayer CropScience SA-NV
Postbus 88
2130 AB Hoofddorp
Tel. 023-7991095