

Atención

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los vapores / el aerosol. Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón. Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. Evitar su liberación al medio ambiente. Recoger el vertido.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE

Medidas básicas de actuación:

- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar.
- En caso de ingestión, enjuagarse la boca. No provocar el vómito y no administrar nada por vía oral.
- Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial.

NO DEJE SOLO AL ACCIDENTADO EN NINGÚN CASO.



UFI: 62E0-30PD
6007-DSN6

Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son:

- Dermatitis de contacto y sensibilización.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

- Tratamiento sintomático.

Mitigación de riesgos en la manipulación

En todos los cultivos autorizados, en pulverización normal con tractor, durante la mezcla/carga se deberán utilizar guantes de protección química y durante la aplicación, mantenimiento y limpieza del equipo se deberán utilizar guantes, ropa de protección química (tipo 3 o 4) y calzado adecuado.

Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, siempre que se mantengan las ventanas cerradas.

En todos los cultivos autorizados se deberá utilizar, durante la reentrada, guantes de protección química sólo en labores que se excedan más de dos horas.

La reentrada se realizará a los 9 días en vid y a los 4 días en melocotonero (incluyendo nectarino), cerezo y albaricoquero, sólo en labores que se excedan más de dos horas.

No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química.

No entrar al cultivo hasta que el producto esté seco.

El preparado no se usará en combinación con otros productos.

Mitigación de riesgos ambientales

Para proteger a los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad hasta las masas de agua superficial, de 10 m con cubierta vegetal para los usos en melocotonero (incluyendo nectarino), albaricoquero y cerezo y de 5 m con cubierta vegetal para el uso en vid.

Para proteger a las plantas no objetivo, para melocotonero (incluyendo nectarino), albaricoquero, cerezo, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta la zona no cultivada.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE

(No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales / Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Gestión de envases

Enjuague energéticamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado al depósito del pulverizador. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (SIGFITO).



Luna® PRIVILEGE

COMPOSICIÓN:

fluopyram 50% p/v (500 g/L).

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona (CAS 2634-33-5) con hidróxido sodico (CAS 1310-73-2) y mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3-1) (CAS 55965-84-9)

1L Contenido neto

Fungicida para el control de monilia en melocotonero (incluye nectarino), albaricoquero y cerezo y para el control de oídio de la vid y botrytis en vid

Suspensión concentrada (SC)

GRUPO 7 FUNGICIDA

Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta. Uso reservado a agricultores y aplicadores profesionales.



Fabricado por:
Bayer S.A.S.
74 rue Gorge de Loup
69009 Lyon
Francia

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y Material Fitosanitario con el número: 25.439

Inscrito y distribuido por:
Bayer CropScience, S.L.
Av. Baix Llobregat, 3 - 5
08970 Sant Joan Despí
Barcelona
Tel. 93 228 40 00

www.cropscience.bayer.es

Luna® Privilege es un fungicida a base de fluopyram, nueva sustancia activa de excelente eficacia para el control de monilia (*Monilinia* spp.) en frutales de hueso y para el control de oídio de la vid (*Erysiphe necator*) y *Botrytis* spp. en vid.

Aplicaciones autorizadas

- **Melocotonero** (incluye nectarino), **albaricoquero** y **cerezo**, para el control de monilias (*Monilinia* spp.).
- **Vid de mesa** y **vid de vinificación**, para el control de oídio de la vid (*Erysiphe necator*) y *Botrytis* spp.

Dosis y modo de empleo

Pulverización normal al aire libre mediante tractor con una aplicación por campaña en todos los usos autorizados:

- **Melocotonero** (incluye nectarino), **albaricoquero** y **cerezo**, para el control de monilia (*Monilinia* spp.) a la dosis de 0,03-0,05% (30-50 ml/ha). No sobrepasar la dosis máxima de aplicación de 0,4 L de producto/ha. Aplicar durante la floración, o bien durante el periodo de maduración de los frutos.
- **Vid de mesa** y **vid de vinificación**, para el control de oídio de la vid (*Erysiphe necator*) a la dosis de 0,015-0,02% (15-20 ml/ha) y de *Botrytis* spp. a la dosis de 0,04-0,05% (40-50 ml/ha). No sobrepasar la dosis máxima de aplicación de 0,2 L de producto/ha. Aplicar a partir del cuajado hasta el estadio BBCH 73 (bayas del tamaño de un perdigón). En vid, no realizar más de 2 aplicaciones por campaña, en total, con productos que contengan fluopyram o fluopicolida. "No mezclar con fosfitos".

Para evitar residuos en los cultivos sucesivos, no es aconsejable cultivar cardo, ni hinojo, tras la recolección de un cultivo tratado con Luna® Privilege o con cualquier otro producto que contenga fluopyram. En el caso de cultivos que vayan a ser exportados fuera de la UE, se aconseja confirmar la existencia de LMRs en los países de destino.

Plazo de seguridad

Entre el último tratamiento y la recolección:

- 3 días en melocotonero (incluye nectarino), cerezo y vid de mesa.
- 14 días en albaricoquero y vid de vinificación.

Observaciones

Para evitar la aparición de resistencias, respetar estrictamente las limitaciones de esta etiqueta en el número de aplicaciones por campaña. Es aconsejable que las aplicaciones de Luna® Privilege se alternen con fungicidas pertenecientes a diferentes familias químicas. En los casos en que se haga un calendario con muchas aplicaciones continuadas, las mezclas con otros productos serán aconsejables para evitar la aparición de resistencias.

Nota: Las recomendaciones e información que facilitamos en esta etiqueta, son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización del producto pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido del producto. El usuario es responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de esta etiqueta.

Lote y fecha de fabricación: Ver marcado impreso.



ES84449776H

Bayer