

REGISTRO DE MOVENTO GOLD EN CEBOLLA, AJO Y CHALOTE:

Cultivo	Plaga	Dosis	Nº Tratamientos	LMRs (mg/kg)
Cebolla	Trips	0,6 – 0,75 l/ha	4	0,4
Ajo				0,1
Chalote				0,4

- Plazo de seguridad del producto en estos cultivos de 7 días.
- Aplicar a partir de que el cultivo tenga un mínimo 5 hojas.
- Intervalo mínimo entre tratamientos de 7 días.
- Antes de utilizar el producto, léase detenidamente la etiqueta.



Bayer CropScience, S.L.
www.cropscience.bayer.es

MOVENTO
GOLD

Nada escapa a su mirada.



MOVENTO
GOLD





- Doble sistemía (ascendente-descendente).
- Eficaz sobre un amplio rango de plagas.
- Gran persistencia de control.
- Compatible con insectos auxiliares.


Su materia activa, spirotetramat pertenece a la clase química de los ácidos tetrámicos (Grupo IRAC N° 23).

Dicha materia activa presenta una característica única que es su doble sistemía (ascendente y descendente) que permite la movilidad del producto en la planta cuando tiene movimiento de savia.

Movento® Gold es compatible con insectos auxiliares, lo cual le convierte en una excelente herramienta en los programas de Producción Integrada de diversos cultivos. El producto es eficaz sobre un amplio rango de plagas como cochinillas, psilidos, pulgones, moscas blancas y trips.



Planta para evaluar la actividad sistémica del producto.



Protección de nuevas hojas, brotes, hasta la raíz.

Es eficaz sobre estadios juveniles por ingestión y tiene un notable efecto sobre el potencial reproductor de adultos.

Es recomendable realizar los tratamientos al inicio de la infestación sobre poblaciones en fase de crecimiento.



- Control eficaz de la población, maximizando la producción.
- Compatibilidad con auxiliares, permitiendo su ayuda para reducir la población de trips.

MOVENTO® GOLD EN CEBOLLA

Movento® Gold es un insecticida muy activo para el control de insectos picadores/chupadores, incluido el Trip tabaci presente en la cebolla.

RECOMENDACIONES DE USO:

- La eficacia de Movento® Gold está estrechamente ligada a la actividad sistémica de la planta, por tanto, situaciones extremas de estrés hídrico o de parón vegetativo por condiciones climáticas muy desfavorables, pueden ralentizar o disminuir los efectos del producto.
- Se recomienda realizar las aplicaciones al inicio de la presencia de los trips, sobre la fase inicial de su instalación. "Se recomienda la aplicación del producto en bloques de dos tratamientos con un intervalo entre ellos de 14 a 20 días en función del nivel de población y época del año (intervalos más cortos a mayor población y temperatura)".
- Se recomienda el uso de un mojante registrado en el cultivo para asegurar la correcta adherencia del producto a las hojas del cultivo.
- Cuando se realice la operación de preparación del tanque de pulverización (manejo del producto), es imprescindible utilizar guantes para evitar el contacto del producto con la piel.




RECOMENDACIONES DE USO PARA EL CONTROL DE TRIPS:

- Dosis: 0,6-0,75 l/ha
- Momento de aplicación: presencia de las primeras poblaciones de adultos en el cultivo.
- Estrategia de control: Repetir el tratamiento a los 14-20 días del primero. Mayor intervalo en primavera y menor en verano.
- Es compatible con programas de respeto de fauna auxiliar.
- Realizar aplicaciones de calidad, promoviendo la retención del producto en las hojas.


RESULTADOS SOBRE CONTROL DE TRIPS

% EFICACIA:
(14 días del 2º tratamiento)



Nivel ataque: 84 trips/planta

RENDIMIENTO:



2xMovento® Gold (0,75 l/ha) vs testigo sin tratar

