



Mais noites de sono tranquilo

PROFILER®



Persistência contra o míldio da videira

- Actividade prolongada.
- Seguro no período de maior sensibilidade à doença.
- Protecção completa, de cachos e folhas.

www.bayercropscience.pt

Utilize os produtos fitofarmacêuticos de forma segura.
Leia sempre os rótulos e a informação relativa aos produtos antes de os utilizar.
Em caso de dúvida consulte os serviços técnicos da Bayer.

Épocas de Tratamento em Videira (uva de vinho)

Problemas	Repouso vegetativo	Ponta verde	Saída das folhas	Folhas soltas	Cachos visíveis	Cachos separados	Botões florais separados	Floração	Alimpa	Bago de chumbo	Bago de ervilha	Fecho dos cachos	Pintor	Antes vindima
Infestantes	Gramíneas Targa® Gold (1-3 L/ha)													
	Videiras > 3 anos Roundup® UltraMax (1,5-10 L/ha)													
Escoriose		Rhodax® Flash (0,9 kg/ha) ⁽¹⁾												
Míldio				Rhodax® Flash (1,5-3 kg/ha) ou Profiler® (1,25-2,5 kg/ha) ou Melody® Super (1,5-3 kg/ha) ou Melody® (0,65-1,3 kg/ha)						Melody Cobre (1,5 kg/ha) ⁽²⁾				
Oídio			Prosper® (0,6 L/ha) ⁽³⁾		Luna® Experience ⁽⁴⁾ (0,1-0,4 L/ha)		Flint® (0,15 kg/ha) ou Flint® Max (0,16 kg/ha) ⁽³⁾		Luna® Experience ^{(3) (4)} (0,1-0,4 L/ha)		Prosper® (0,6 L/ha) ⁽³⁾			
Podridão cinzenta								Teldor® (1,5 kg/ha) Serenade® Max (2,5-4 Kg/ha)					Teldor® (1,5 kg/ha) Serenade® Max (2,5-4 Kg/ha)	
Podridão negra					Flint® Max (0,12 kg/ha) ou Flint® (0,15-0,25 kg/ha) ⁽²⁾									
Ácaros	Garbol® (5,25-15 L/ha)	Envidor® (0,3-0,4 L/ha) ⁽⁵⁾								Envidor® (0,3-0,4 L/ha) ⁽⁵⁾				
Cicadelídeos									Decis® Expert (125 ml/ha) ⁽⁶⁾					
Cochonilhas	Garbol® (5,25-15 L/ha)				Movento® O-TEQ (0,5 L/ha) ⁽⁷⁾									
Traça				Coragen® (0,1-0,2 L/ha) ⁽⁸⁾										
Adubações foliares			Complestal® 12-4-6 (2-3 L/ha)							Complestal® 5-8-10 (4-6 L/ha)				
									Complestal® Cálcio (3-4 L/ha)					
						Cenfol® (0,75 L/ha)			Cenfol® (0,75 L/ha)		Cenfol® (0,75 L/ha)			

(1) ou **Enxofre Bayer** (4-5 Kg/ha); (2) ou **Mancozan**® (0,6-2 Kg/ha); (3) É possível alternar todos os produtos indicados para oídio com **Enxofre Bayer** (4-12,5 Kg/ha); (4) ou **Libero Top** (0,4 Kg/ha), **Luna Privilege** (60-200 mL/ha) ou **Horizon** (0,4 L/ha); (5) Máximo de 1 aplicação; (6) ou **Decis® EVO** (0,25-0,7 L/ha); (7) ou **Movento® Gold** (0,4-0,75 L/ha); (8) ou **Altacor**® (0,1 Kg/ha), **Decis® EVO** (0,25-0,7 L/ha) ou **Decis® Expert** (0,15 L/ha);

Épocas de Tratamento em Videira (uva de mesa)

Problemas	Fases da Vinha													
Gramíneas	Targa® Gold ⁽¹⁾ (1-3 L/ha)													
Infestantes >4 anos	Roundup® UltraMax (1,5-10 L/ha)													
Escoriose		Rhodax® Flash (0,9 kg/ha)												
Míldio			Profiler® (1,3-2,5 kg/ha) ⁽²⁾					Melody® Cobre ⁽³⁾ (1,5 kg/ha)						
Oídio		Prosper® (0,6 L/ha) ou Horizon® (0,4 L/ha) ⁽⁴⁾		Flint® (0,15 kg/ha) ou Flint® Max (0,16 kg/ha) ⁽⁵⁾			Luna® Privilege (60-200 ml/ha) ⁽⁶⁾	Flint® (0,15 kg/ha) ou Flint® Max (0,16 kg/ha) ⁽⁵⁾		Prosper® (0,6 L/ha) ou Horizon® (0,4 L/ha) ⁽⁴⁾				
Podridão cinzenta							Teldor® (1,5 kg/ha) ou Serenade® Max (2,5 a 4 Kg/ha)				Teldor® (1,5 kg/ha)			
Podridão negra				Flint® (0,15-0,25 kg/ha) ou Flint® Max (0,12 kg/ha) ⁽⁵⁾										
Ácaros	Garbol® (5,25-15 L/ha)		Envidor® (0,3-0,4 L/ha) ⁽⁷⁾							Envidor® (0,3-0,4 L/ha) ⁽⁷⁾				
Cicadelídeos								Decis® Expert (125 ml/ha)						
Cochonilhas	Garbol® (5,25-15 L/ha)					Movento® O-TEQ (0,5 L/ha) ⁽⁸⁾								
Mosca da fruta													Decis®Trap (50-80und/ha) ⁽⁹⁾	
Traça				Coragen® (0,1-0,2 L/ha) ⁽¹⁰⁾										
Adubações foliares			Complestal® 12-4-6 (2-3 L/ha)						Complestal® 5-8-10 (4-6 L/ha)					
								Complestal® Cálcio (3-4 L/ha)						
						Cenfol® (0,75-1 L/ha)		Cenfol® (0,75-1 L/ha)		Cenfol® (0,75-1 L/ha)				

(1) Antes da floração da grama; (2) Máximo 2 aplicações; (3) **Mancozan** (0,6-2 Kg/ha) ou **Cupravit** (3-6 Kg/ha); (4) Ou **Libero Top**® (0,4 Kg/ha); (5) Não efectuar mais do que 2 tratamentos com **Flint Max** e no máximo 3 com Qol's; (6) Aplicar a partir da alimpa até ao estado bago de chumbo (BBCH 69-73), realizar no máximo 1 tratamento por campanha; É também possível alternar todos os produtos indicados para o Oídio com **Enxofre Bayer WG** (4-12,5 Kg/ha); (7) Máximo de 1 aplicação; (8) ou **Movento Gold** (0,40-0,75 L/ha); (9) Em caso de aumento populacional, efetuar tratamentos inseticidas; (10) **Altacor** (50-120 g/ha), **Decis EVO** (0,25-0,7 L/ha) ou **Decis Expert** (0,13-0,17 L/ha).