PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Ficha de segurança fornecida a a pedido.

ATENÇÃO

Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
Para proteção de plantas não visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às zonas circunvizinhas.
Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de superfície de 5 metros em batateira e tomateiro (ao ar livre).
Em caso de intoxicação, contactar o Centro de Informação Antivenenos (CIAV). Telef: 800 250 250.
Ed. 21018

[UFI: HT60-509D-U003-3V3G]

Armazenamento:
Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.

valorfito

A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada, e colocada em sacos de recolha, devendo estes ser entregues num ponto de retoma autorizado; as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

Os resultados da aplicação deste produto são suscetíveis de variar pela ação de fatores que estão fora do nosso domínio, pelo que nos responsabilizamos apenas pelas características previstas na lei.

5 603782 151110

PT79877056F

Bayer

BAYER

sencor® Liquid

Contém **1 L**

Suspensão concentrada (SC) com 600 g/L ou 52,17% (p/p) de metribuzina

Herbicida

residual contra infestantes da cultura da batateira, tomateiro e cenoura

GRUPO 5 HERBICIDA

Autorização de venda n.º **0435** concedida pela DGAV

Lote N.º e Data Produção: impressos na embalagem

ESTE PRODUTO DESTINA-SE AO USO PROFISSIONAL

PARA EVITAR RISCOS PARA A SAÚDE HUMANA E PARA O AMBIENTE, RESPEITAR AS INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Titular da Autorização de Venda:
Bayer CropScience (Portugal)
Produtos para a Agricultura, Lda.
Av. Vitor Figueiredo, N.º 4 - 4.º Piso
2790-255 CARNAXIDE
Telef.: 21 417 21 21
https://cropscience.bayer.pt

O **Sencor Liquid** é um herbicida residual, sistémico e com alguma ação de contato, de absorção radicular e foliar, destinado ao controlo de infestantes anuais monocotiledóneas e dicotiledóneas nas culturas da batateira, tomateiro e cenoura. A metribuzina pertence à família química 1,2,4-triazinona, que tem como modo de ação a inibição da fotossíntese ao nível do fotossistema II.

UTILIZAÇÕES, DOSES/CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Em batateira: Aplicar em pré-emergência da cultura ou até que 5% dos brolhos atinjam as 2 folhas verdadeiras (2 a 5 cm). As infestantes não devem ultrapassar as 2 folhas.

Dose: 0,875 L/ha. No momento da aplicação, o solo deve estar bem preparado e húmido. Não mobilizar o solo depois da aplicação. Assim, sempre que possível, a amontoa deve ser feita antes da aplicação do herbicida, mais cedo que o habitual.

Em tomateiro: Aplicar o herbicida após ultrapassada a crise de transplantação e após a emergência das infestantes até à fase de 2 folhas.

Dose: 0,875 L/ha. O herbicida deve ser pulverizado nos regos. A terra deve estar molhada ou muito húmida para que o herbicida actue e seja incorporado no solo, pelo que, se estiver enxuta, deverá proceder-se a uma rega na hora a seguir à aplicação. Depois da aplicação do herbicida não se deve mobilizar o solo.

Em cenoura: Aplicar o herbicida a partir das 2 a 3 folhas da cultura, após a emergência das infestantes até à fase de 2 folhas.

Dose: 0,25 L/ha. No momento da aplicação o solo deve estar bem preparado e húmido. Não aplicar com o terreno seco, se necessário proceder a uma rega após a aplicação. Não mobilizar o solo depois da aplicação.

Este produto não deve ser aplicado com pulverizador manual.

INFESTANTES SUSCETÍVEIS

Bredos *(Amaranthus* spp.*)*, bolsa-de-pastor *(Capsella rubella)*, catassol *(Chenopodium album)*, erva-moleirinha *(Fumaria officinalis)*, lâmio *(Lamium amplexicaule)*, cabelo-de-cão *(Poa annua)*, erva-pessegueira *(Polygonum persicaria)*, beldroega *(Portulaca oleracea)*, figueira-do-inferno *(Datura stramonium)*, milhã-pé-de-galo *(Echinochloa crus-galli)*, milhã-digitada *(Digitaria sanguinalis)*, milhã-verde *(Setaria viridis)*, mal-casada *(Polygonum lapathifolium)*, serralha-macia *(Sonchus oleraceus)*, morrião *(Anagallis arvensis)*, margaça *(Chamaemelum mixtum)*, erva-febra *(Lolium rigidum)*, azevém *(Lolium multiflorum)*, papoilas *(Papaver* spp.*)*, saramago *(Raphanus raphanistrum)* e sempre-noiva *(Polygonum aviculare)*.

INFESTANTES RESISTENTES

Junça *(Cyperus rotundus)*, juncinha *(Cyperus esculentus)*, erva-moira *(Solanum nigrum)* - a partir da fase de 2 folhas, graminhão *(Paspalum paspalodes)*, corriola *(Convolvulus arvensis)* e escalracho *(Panicum repens)*.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

A aplicação repetida do **Sencor Liquid** ou de herbicidas com o mesmo modo de ação pode provocar o desenvolvimento de biótipos resistentes de algumas infestantes indicadas no rótulo como suscetíveis. As triazinas têm como mecanismo de ação a inibição da fotossíntese. Tendo em vista minorar riscos de desenvolvimento de resistência, recomenda-se não aplicar o **Sencor Liquid** mais do que 2 anos consecutivos nos mesmos solos, procedendo, sempre que possível, à alternância com herbicidas de modo de ação diferente.

Não aplicar em batatais semeados em zonas de areia solta.

Evitar aplicar o herbicida em tomatais com plantas doentes.

Não se deve semear ou plantar qualquer cultura diferente das referidas no rótulo antes de decorridos 5 meses de aplicação do **Sencor Liquid.**

Não atingir terrenos e culturas vizinhas da área a tratar.

Não aplicar o herbicida em mistura com adubos líquidos.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

AGITAR BEM ANTES DE USAR

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Agitar bem o produto na embalagem, até ficar homogéneo. Juntar a quantidade de produto necessário e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda. A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as doses indicadas.

Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm^2 e/ou usar bicos antiarrastamento.

Volume de calda a utilizar: 400 a 600 L/ha.

amostra