



Volare®

Protecção perfeita

contra o míldio da batateira



O novo padrão no controlo do Míldio

- Protecção de folhas, caules e tubérculos
- Penetrante translaminar e sistémico
- Livre de produtos de contacto
- Resistente à lavagem
- Utilização fácil e cómoda

Épocas de Tratamento em Batata

Fases da Batateira												
Problemas	Antes da plantação	Abrolhamento	Crescimento			Formação tubérculos	Floração	Tubérculos crescimento	Amarele- cimento	Tubérculos maduros	Armaze- nagem	
Infestantes	Artist (1,5-2 kg/ha)		Targa Gold (1-3 L/ha)									
		Challenge (2,5-3 L/ha)										
	Roundup UltraMax (1,5-10 L/ha)	Sencor Liquid (0,875 L/ha)										
Rizoctónia (tratamento de tubérculos)	Monceren (1 L/ton batata)											
Alternariose		Mancozan (1-2 kg/ha)										
Míldio		Mancozan (1-2 kg/ha) ou Volare (1,2-1,4 L/ha)										
Epitrix			Calypso (0,15 L/ha)									
Escaravelho			Calypso (0,1-0,15 L/ha) ou Coragen (50-60 ml/ha)*						Decis EVO (0,3-0,5 L/ha)*			
Adubações Foliares			Cenfol (1 L/ha) Complestal 12-4-6 (10 L/ha)		Cenfol (1 L/ha) Complestal 5-8-10 (10 L/ha)							
Grelamento											Birgin (1 Kg/ton)	

*ou Decis Expert (75 mL/ha), produtos com ação secundária sobre afídeos, Epitrix spp. e traça da batata, quando aplicados sobre a cultura no campo.