



VYNYTY®

Grapholita Press

250 g Contenido neto



Fitosanitario utilizable en producción vegetal ecológica según R (UE) 2018/848 conforme a la Norma UNE 315500

CONFUSIÓN SEXUAL
contra la polilla oriental
(*Grapholita molesta*) en
frutales de hueso y pepita.
Solución de Biocontrol

Suspensión de cápsulas (CS)

COMPOSICIÓN: Mezcla de (E/Z)-8-dodecen-1-yl acetato + (Z)-8-dodecen-1-ol (10% p/p)

Antes de utilizar el producto,
léase detenidamente la etiqueta.
Uso profesional agrario.

Inscrito y fabricado por: **M2i Biocontrol S.A.S.**
1 Rue Royale, 112 Bureaux de la Colline
92213 Saint-Cloud Cedex. Francia

Inscrito en el Registro Oficial de Productos y
Material Fitosanitario con el número: **ES-01420**



Apto para
Agricultura
Ecológica
según
Reglamento
(UE)
2021/1165

Distribuido por:
Bayer CropScience, S.L.
Av. Baix Llobregat, 3-5
08970 Sant Joan Despí
Barcelona. Tel. 93 228 40 00
www.cropscience.bayer.es



UFI:
0R7K-176C
1V1A-GPP9

Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Evitar respirar los vapores. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar guantes, prendas y gafas de protección. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar con abundante agua y jabón. Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos. Recoger el vertido. **EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA: Teléfono: 91 562 04 20. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta. A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.**

INFORMACIÓN SOBRE PRIMEROS AUXILIOS (Reglamento 547/2011)

Medidas básicas de actuación: Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: Irritación de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. Dermatitis de contacto y sensibilización. Confusión, cefalea, náuseas y vómitos. Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada. En contacto con los ojos, lavar con abundante agua al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. En contacto con la piel, lavar con agua y jabón sin frotar. En caso de ingestión, NO provoque el vómito; salvo que así lo indique el centro de toxicología o un profesional de la salud. Enjuagar la boca y no administrar nada por vía oral. Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario
Tratamiento sintomático y de soporte.

Mitigación de riesgos en la manipulación

Seguridad del aplicador, trabajador y demás personas expuestas: Durante la colocación y manejo de los dispositivos, se deberá utilizar: guantes de protección química, calzado cerrado y ropa de trabajo adecuada o C1

Eliminación del producto: NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE (No limpiar el equipo de aplicación del producto, cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

ES90421020B

Vynity® Grapholita Press. Composición: Mezcla de (E/Z)-8-dodecen-1-yl acetato + (Z)-8-dodecen-1-ol (10% p/p). **Distribuido por:** Bayer CropScience, S.L. Avda. Baix Llobregat, 3-5, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona). Tel. 932 284 000.

Vynity® Grapholita Press evita que los insectos macho localicen a las hembras, evitando el apareamiento y controlando la población de la plaga.

Usos y dosis autorizados

Uso	Agente	Dosis	Método de aplicación
Frutales de hueso y de pepita	Polilla oriental <i>Grapholita molesta</i>	500 puntos de difusión/ha (corresponden a 1,25 kg/ha)	Producto listo para usar. No diluir en agua. Aplicar al inicio del primer vuelo

Sistema de cultivo: Aire libre. **Número de aplicaciones por año:** 1.

Vynity® Grapholita Press es una feromona en forma de gel que se aplica mediante un dispositivo manual adaptado y reutilizable (Vynity® Phero Pump) que usa aire comprimido (máx. 6 bares) para administrar depósitos de gel (o "puntos de difusión").

Instrucciones de uso: Dosis: Aplique 500 puntos por hectárea de Vynity® Grapholita Press (1,25 kg) distribuidos homogéneamente en la parcela (aprox. 1 punto por cada 20 m²). Máx. 1 aplicación al año.

Periodo de aplicación: Aplicar durante BBCH 57-69, antes del comienzo del vuelo de la primera generación. Una sola aplicación cubre todo el periodo vegetativo. No aplicar el producto si se prevén lluvias en las 24 h siguientes a la aplicación. Evitar el tratamiento foliar 3h después de la aplicación.

Superficie mínima: 2 hectáreas. Para superficies menores, consulte a su asesor agrícola.

Recomendaciones de aplicación: El producto debe aplicarse homogéneamente en la parcela o idealmente en quincunce (distribución escalonada). Los puntos de difusión pueden aplicarse directamente sobre la corteza de los árboles o sobre cualquier soporte dentro del huerto (por ejemplo, postes de madera o de cemento) a la altura del tercio superior de los árboles. Asegúrese de que el diámetro de la madera es lo suficientemente grande para aplicar el punto de difusión. No aplicar sobre hojas y frutos. Favorecer la aplicación en el lado Norte para evitar la luz solar directa. Reforzar siempre los bordes de la parcela tratada. Tener en cuenta la forma y dimensión de la parcela tratada, la dirección de los vientos dominantes y el tipo de tratamiento de control de *Grapholita molesta* en las parcelas limítrofes que puedan ser fuentes de migración de la plaga.

Precauciones de uso: Asegurarse de colocar trampas de monitoreo dentro y fuera de la parcela tratada antes del primer vuelo y revisarse semanalmente para controlar las poblaciones de plagas. Vynity® Grapholita Press forma parte de un programa de Gestión Integrada de Plagas y puede complementarse con tratamientos adicionales durante la temporada en caso de alta presión de plagas. Se recomienda evaluaciones periódicas de los daños en brotes y/o frutos durante todo el periodo para determinar la necesidad de tratamientos complementarios. Consulte a su asesor agrícola para decidir la cantidad y la posición de los posibles tratamientos complementarios.


Plazos de Seguridad: No procede. **Mezclas:** No mezclar. Aplicar solo Vynity® Grapholita Press. **Compatibilidad:** Vynity® Grapholita Press es compatible con las actividades habituales de gestión del cultivo realizadas durante la temporada.

Almacenamiento: Almacenar en su envase original en lugar seco, bien ventilado y protegido de la luz solar entre 0 y 30 °C y un máximo de 2 años. Proteger de las heladas.

Gestión de envases: No reutilizar el envase. Durante su uso, vaciar completamente la bolsa de aluminio utilizando el dispositivo de presión de aplicación. Deposite los residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por el sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor (SIGFITO).



Nota: Está prohibida la reproducción total o parcial de esta etiqueta. Respete los usos, dosis, condiciones y precauciones mencionados en el envase, estos han sido determinados mediante pruebas y ensayos rigurosos. Sin embargo, tenga en cuenta que no es posible tener en cuenta todas las variables y eliminar todos los riesgos asociados a su uso. El fabricante garantiza la calidad del producto vendido en su envase original y almacenado de acuerdo con las condiciones recomendadas, así como su conformidad con la Autorización de Comercialización expedida por las autoridades locales competentes. En ningún caso el fabricante será responsable de cualquier daño, físico o material, directo o indirecto, derivado de la utilización del producto incumpliendo total o parcialmente las instrucciones de esta etiqueta. Cualquier renuncia a esta garantía solo será válida si es emitida por escrito por un representante legalmente autorizado del fabricante.



Bayer

Lote y fecha de fabricación:
Ver marcado impreso.

ES90423031B